



## Vicks Flu Tripla Azione

Paracetamolo 500 mg, guaifenesina 200 mg, fenilefrina HCl 10 mg.  
Polvere per soluzione orale

### Legga attentamente questo foglio poiché contiene importanti informazioni per lei.

Questo medicinale è disponibile senza prescrizione medica. Tuttavia, per ottenere i migliori risultati, è necessario prestare attenzione nell'impiego di Vicks Flu Tripla Azione.

- **Conservi questo foglio.** Potrebbe avere bisogno di leggerlo di nuovo.

- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se i sintomi peggiorano o non migliorano dopo 3 giorni, contatti il medico.
- Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio, informi il medico o il farmacista.

### Contenuto di questo foglio illustrativo:

1. Che cos'è Vicks Flu Tripla Azione e a che cosa serve
2. Prima di prendere Vicks Flu Tripla Azione
3. Come prendere Vicks Flu Tripla Azione
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Vicks Flu Tripla Azione
6. Altre informazioni

## 1. CHE COS'È VICKS FLU TRIPLA AZIONE E A CHE COSA SERVE

Vicks Flu Tripla Azione è indicato per il sollievo sintomatico in caso di raffreddore e influenza.

Contiene tre principi attivi:

- il paracetamolo è un noto antidolorifico (attenua il dolore). E' efficace contro il dolore incluso il mal di testa e il mal di gola, può inoltre ridurre la febbre (antipiretico);
- la guaifenesina (un espettorante) scioglie il catarro, contribuendo ad attenuare la tosse grassa;

- la fenilefrina cloridrato (un decongestionante nasale) riduce il gonfiore dei dotti nasali, dando sollievo in caso di naso congestionato.

**BISOGNA USARE VICKS FLU TRIPLA AZIONE SOLO SE SI HA DOLORE O FEBBRE, CONGESTIONE NASALE E TOSSE GRASSA.**

## 2. PRIMA DI PRENDERE VICKS FLU TRIPLA AZIONE

### Non prenda Vicks Flu Tripla Azione

- se è allergico al paracetamolo, alla guaifenesina, alla fenilefrina cloridrato o ad uno qualsiasi degli eccipienti (vedere paragrafo 6)
- se è affetto da patologie cardiache

- se soffre di ipertensione (pressione alta)
- se ha problemi al fegato o patologie renali gravi
- se soffre di ipertiroidismo
- se è diabetico
- se è affetto da glaucoma (aumento della pressione dell'occhio) ad angolo chiuso
- se è affetto da porfiria (un disturbo ereditario caratterizzato da una quantità eccessiva di pigmenti nelle urine)
- se sta assumendo antidepressivi triciclici
- se sta assumendo betabloccanti
- se sta assumendo gli inibitori della monoaminoossidasi (IMAO) – utilizzati nel trattamento della depressione o della malattia di Parkinson – o se li ha assunti negli ultimi 14 giorni

- se sta assumendo medicinali per l'abbassamento della pressione sanguigna o per il trattamento dell'angina.

Non somministri Vicks Flu Tripla Azione a bambini di età inferiore a 12 anni. Importante: contiene paracetamolo. Non assumere contemporaneamente ad altri prodotti contenenti paracetamolo. In caso di sovradosaggio, rivolgersi immediatamente al medico anche in assenza di malessere, in quanto vi è il rischio di serio e ritardato danno epatico. Non assumere contemporaneamente ad altri prodotti decongestionanti o contro influenza o raffreddore.

Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere Vicks Flu Tripla Azione

- se soffre di problemi al fegato
- se è di sesso maschile e presenta un ingrossamento della ghiandola prostatica, con possibilità di una maggiore difficoltà a urinare
- se ha problemi circolatori (compresa la sindrome di Raynaud)
- se manifesta tosse persistente o cronica, come avviene con il fumo, asma, bronchite cronica o enfisema.

## Assunzione di Vicks Flu Tripla Azione con altri medicinali

Informi il medico o il farmacista prima di prendere Vicks Flu Tripla Azione se sta assumendo medicinali:

- contenenti **paracetamolo o altri decongestionanti per raffreddore e influenza.** Se li sta assumendo, non prenda Vicks Flu Tripla Azione.
- **inibitori della monoamino ossidasi (IMAO)**, impiegati nel trattamento della depressione o della malattia di Parkinson. **Non prenda** Vicks Flu Tripla Azione se ha assunto IMAO negli ultimi 14 giorni.
- **antidepressivi triciclici** per il trattamento della depressione, quali amitriptilina o imipramina.
- Medicinali per la **pressione alta** (antipertensivi), inclusi i beta-bloccanti, o medicinali per migliorare le funzionalità cardiache o correggere anomalie del ritmo cardiaco (digossina, lanossina, digitossina).
- Fenotiazine (utilizzati come farmaci antipsicotici per il trattamento di condizioni quali la schizofrenia o la paranoia o per prevenire nausea e vomito).
- Medicinali per la **nausea e il vomito** (come metoclopramide o domperidone).

- Medicinali per **fluidificare il sangue** (anticoagulanti), come warfarin o altri farmaci cumarinici.
- Medicinali per il **colesterolo alto** (come la colestiramina).
- Sedativi (barbiturici).
- Probenecib o AZT (zidovudina).
- Isoniazide (usato per il trattamento o la prevenzione della tubercolosi).

## Assunzione di Vicks Flu Tripla Azione con cibo e bevande

Non assuma questo prodotto con bevande alcoliche.

**Gravidanza e allattamento**  
**L'assunzione di Vicks Flu Tripla Azione durante la gravidanza o l'allattamento non è raccomandata: chieda consiglio al medico o al farmacista prima dell'uso.**

## Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Questo medicinale può causare confusione e capogiri. Se è affetto da questi sintomi non guidi o utilizzi macchinari.

## Informazioni importanti su alcuni eccipienti di Vicks Flu Tripla Azione

Questo prodotto contiene:

- aspartame (E951), Questo medicinale contiene una fonte di fenilalanina. Può esserle dannoso se è affetto da fenilchetonuria;

- saccarosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale;
- sodio (157 mg per dose). Da tenere in considerazione in persone con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta a basso contenuto di sodio.

## 3. COME PRENDERE VICKS FLU TRIPLA AZIONE

Prenda sempre Vicks Flu Tripla Azione seguendo esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi, consulti il medico o il farmacista.

### Dosaggio

Questo medicinale si presenta sotto forma di polvere da sciogliere in acqua e assumere come bevanda calda.

Versare il contenuto di una bustina in una tazza di medie dimensioni e aggiungere acqua calda non bollente (250 ml circa). Lasciare raffreddare fino a una temperatura bevibile.

Adulti e bambini al di sopra dei 12 anni: 1 bustina ogni 4-6 ore secondo le indicazioni. Non assumere più di 4 bustine nell'arco di 24 ore.

## Non somministrare a bambini di età inferiore a 12 anni.

**Non superare la dose raccomandata.**

Non assuma questo medicinale con bevande alcoliche.

Non è raccomandato l'utilizzo del medicinale per lunghi periodi.

Se i sintomi persistono per più di 3 giorni o peggiorano, consulti il medico.

**Se prende una quantità di Vicks Flu Tripla Azione maggiore di quella indicata:**

**Si rivolga immediatamente a un medico** se prende accidentalmente più medicinale di quanto deve o se dà a un bambino una dose maggiore di quella raccomandata, **anche in assenza di malessere, in quanto vi è il rischio di serio e ritardato danno epatico.**

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

## 4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, Vicks Flu Tripla Azione può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se manifesta uno qualsiasi dei seguenti effetti indesiderati seri, interrompa immediatamente l'assunzione del medicinale e richieda un controllo medico urgente.

- Molto raramente sono stati riportati casi di gravi reazioni cutanee. Reazioni allergiche gravi (anafilassi), respiro sibilante o difficoltà respiratorie. (Molto raro: meno di 1 paziente su 1000, ma più di 1 su 10.000)
- Molto raramente possono verificarsi alcuni disturbi delle cellule ematiche e pancreatici (infiammazione del pancreas) (meno di 1 paziente su 10.000) con il paracetamolo.

## Altri effetti indesiderati

Frequenza	Effetto indesiderato
Comune (meno di 1 paziente su 10, ma più di 1 su 100)	Perdita di appetito, nausea o vomito
Raro (meno di 1 paziente su 1000, ma più di 1 su 10.000)	Reazioni allergiche lievi (come rash cutanei o orticaria) Dolore di stomaco, diarrea Cefalea, vertigini Battito cardiaco accelerato (palpitazioni) Innalzamento della pressione sanguigna Problemi del sonno (insonnia), nervosismo, tremore, irritabilità, irrequietezza e confusione o ansia

## Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: [www.agenziafarmaco.gov.it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/responsabili). Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## 5. COME CONSERVARE VICKS FLU TRIPLA AZIONE

### Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini

Conservare a una temperatura inferiore a 25°C.

Non usi Vicks Flu Tripla Azione dopo la data di scadenza riportata sulla bustina o sulla confezione di cartone. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come smaltire i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## 6. ALTRE INFORMAZIONI

### Cosa contiene Vicks Flu Tripla Azione

Ciascuna bustina di questo medicinale fornisce una dose singola contenente i seguenti **principi attivi**: paracetamolo 500 mg, guaifenesina 200 mg, fenilefrina cloridrato 10 mg.

Gli **eccipienti** sono: saccarosio, acido citrico, acido tartarico, ciclamato di sodio, citrato di sodio, aspartame (E951), acesulfamate potassio (E950), mentolo in polvere, aroma limone, aroma succo di limone, giallo di chinolina (E104). Si veda in fondo alla sezione 2.

## Descrizione dell'aspetto di Vicks Flu Tripla Azione e contenuto della confezione

Vicks Flu Tripla Azione si presenta sotto forma di polvere color avorio confezionata in bustine in laminato poste all'interno di una scatola di cartone. Il prodotto è disponibile in confezioni da 5 e da 10 bustine.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate

## Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

PROCTER & GAMBLE S.r.l. - Viale Giorgio Ribotta, 11 - 00144 Roma.

### Produttore

Wrafter Laboratories Limited, Braunton, Devon, EX33 2DL - Regno Unito

**Questo foglio illustrativo è stato approvato l'ultima volta a: Marzo 2016**

Nome dello Stato Membro: Italia  
Nome del medicinale: Vicks Flu Tripla Azione